

貧乏の大家さんは性教育モデル！

性教育教材に
なつた女たち






●パーソナルデータ

里中チエ (女・●2才)

本年度より●学生。体の発育状態は同年代の中で遅いほうであるが、昨今のモデル不足の中、家庭の事情から性教育モデル助成金を目当てに立候補した勤勉な生徒。

●乳頭勃起



乳房の発育は悪く、まだ膨らみ始めたばかり。●学生女子や肉付きのよい男子とあまり変わらない。しかし、乳頭は30秒ほど刺激し続けると、小さいながらも、しっかりと勃起反応を示す。



左：通常時のチエさんの乳頭
右：勃起時のチエさんの乳頭

●女性器

外見は●学生のような、綺麗なワレメの女性器。初潮は3か月前に経験済み。男性との交際・性交渉経験はなく、クスコ検査では処女膜も確認できる。発育途上ではあるが、性交・出産は可能。



乳頭・乳房の発育

宮村雪さん

(●2才)

男性は大きなおっぱいが大好き!



大きすぎっ?!

私のおっぱい

やだっ!!

小さすぎっ?!

私のおっぱい

やだっ!!

心配無用!



2人の●学1年生のおっぱいを見比べてみよう。同学年の女子同士でも、こんなに発育に差が出ます。発育時期は人によってタイミングも違うので、チエさんも、まだ成長する可能性があります。(このまま大きくなる可能性もあります。)

小さなおっぱいを好む男性もいます!

里中チエさん (●2才)



● 男女の排尿の違い

男性と女性では、尿道が通過する性器の形状の違いにより尿の排出方法も異なります。異性の排尿方法を観察して知っておきましょう。

男性は陰茎内を尿道が通過するため、指で陰茎の向きを変えることにより、尿の排出方向がコントロール可能です。

女性は尿の排出方向のコントロールが難しいため、飛び散りを防ぐため、座って排尿することが多いです。



チエさんの初潮は3か月前、
●2才になって●カ月のときで
した。乳房の発育は芳しくない
チエさんですが、初潮年齢とし
ては平均的です。

生理用品として、チエさんはナプキンを使用しています。チエさんのように男性経験のない女性は、タンポンを膣に挿入することに恐怖心があるケースが多いです。経血の量によっては、タンポンとナプキンの併用が必要なこともあるため、タンポンにも徐々に慣れていくとよいでしょう。




チエさんは家庭の事情で、ナプキンが購入できないこともあり、未使用で下着や学校の椅子を汚してしまった経験があります。どうしても、ナプキンが用意できない場合は事情を話して保健室の備蓄ナプキンなどをもらいましょう。



タンポンの挿入に恐怖心があり、ナプキンのみを使用してきたチエさんですが、経血量が多いときなどを考え、タンポン挿入の練習をしました。タンポン挿入で『処女膜が破れてしまう』と思い込んでいたようですが、カメラでチエさん自身の処女膜を見せながら処女膜に細いタンポンなら十分通る穴があることを見てもらい納得の上、挿入してもらいました。

タンポン初心者には比較的挿入の容易な applicator 付きタンポンがおすすめ。

チエさんも、applicator 付きのタンポンで初挿入に挑戦しました。



はじめての自慰(オナニー)

●学性の女子のほとんどが、自慰経験済みですが、チエさんは性知識の不足のため、自慰未経験でした。

オナニー撮影がはじめてのオナニーということで、自慰用の道具は使わず初心者向けの指オナニーを体験しました。

シーツを膣液で汚さないようにタオルなどを準備しましょう

分泌した膣液などを拭くために清潔なティッシュなどを手元に置きましょう



性器はデリケートな部分です
必ず綺麗に手を洗ってからオナニーしましょう



男性のオナニーの仕方初めて学び、何度か目撃した、チエさんの管理するアパートの住人男性(23)の謎の行為が、オナニーであったことを初めて理解しました。今後は

今後は、男性の部屋の扉をいきなり開けないと決意を固くしました。

鉛筆やドライバーなど長いもの、小さなボールやビー玉など不潔な異物の挿入は性病の原因になります



●男性器)おちんちん)の観察

おちんちんの構造をよく知るために、仮性包茎の男性(30)の男性器を観察。



非勃起時の5センチ程のおちんちんをまじまじと観察するチエさん。間近でおちんちんを見るのは初めて。

勃起途中(半勃起)の男性器。包皮の中から龟头が少し出てきています。



陰茎の大きさと向きが変わり、さらに、龟头の出現に驚き、おちんちんと男性の顔を驚いたように交互に見つめています。

完全勃起した男性器。陰茎は長さ18.2cm、直径4.8mmになりました。



おちんちんの迫りに、目を反らしてしまったチエさん。スタッフによく観察するよう指示されましたが、なかなか直視できません。

射精した男性器。2週間の禁欲により高まった性欲により、自然と射精に至り、非常に濃い精液を射精しました。



射精に驚き、1分ほど無言のまま、男性器を凝視。射精後、陰茎が小さくなるまでしっかりと見続けました。

避妊具を学ぶ

子供を作るためには、男女で性交（セックス）をして、女子の膣内に男性の精液を射精します。

しかし、「性欲を満たす」目的で、子供を作らずにセックスをする機会のほうが多いのが事実です。

子作りを伴わないセックスを安全に行うためには、「避妊具」を 사용합니다。

今回、チエさんには、使用者の多いコンドームという、男性の陰茎に装着するタイプの避妊具を勉強してもらいました。

大きささまざまなサイズの陰茎を持つ男性20人の男性器を手でしごいで勃起させ、最適なサイズのコンドームを選んで装着する練習をしました。

コンドーム
陰茎を勃起させてから
向き（男性側・女性側）
に注意して装着します。

精液だまり
男性が射精した精液を
受け止める部分です。中
に避妊ゼリーが入ってい
ます。

薄い素材のものがコンドーム
未装着のセックスに近い性的刺
激を受けられますが、安全のた
め品質のよい商品を選びましょ
う。




性病検査

(新しいパートナーとのセックスの前後に)


性器は大変デリケートな部分のため、セックスには性交による沢山の感染症のリスクが伴います。

これまでセックスをしたことのない新しいパートナーとのセックスの前後には必ず性病検査を行いましょう。感染されないこと、感染さないことが大切です。また、定期的な性病検査も重要です。公立●学校在学中は定期健診で性病検査を行います。

性病検査では採血や採尿、触診などを行います。



チエさんの女性器の触診（膣内検査）の様子。医師（男性・53）が両手で丁寧に膣を広げ、膣内壁を指で触って異常がないか確認します。



前戯を忘れず、

性交（セックス）において、膣に陰茎を挿入するにあたり、事前に気分を高揚させ、男性の陰茎を勃起させることが必要です。また、膣液やカウパー腺液を十分に分泌させることで、スムーズな挿入と性的快楽を得ることも出来ます。

チエさんには、前戯の一つの方法として、口淫（フェラチオ）を実践してもらいました。

包茎、仮性包茎、非包茎の3名の男性のフェラチオで勃起させることに成功しました。内2名は口内で射精させてしまいましたが、性交の前は射精前ギリギリで止めることも重要になってきます。

単純なピストン運動だけでなく、舌で亀頭を刺激したり、包茎の包皮を口の中で舌を使って剥いたり、口淫のテクニックを実践しました。



前戯で十分に男性の陰茎が勃起したら、膣に男性器を挿れてみましょう。陰茎を膣に出し入れして刺激を与えることで、男性が性的興奮の絶頂に達すると射精します。膣内で射精し、精子が卵子に出会えば赤ちゃんの出来る第一歩です。

チエさんは、初めてのセックスだったため、相手の男性（45）の陰茎の挿入で処女膜が断裂し、破瓜しました。少し血がでたものの、痛みは比較的少なく済みました。妊娠が確認されるまでに、2ヵ月で8回のセックスをして、膣何に30回の射精がされました。



処女喪失前のチエさん



● 専用用具を使った自慰(オナニー)

破瓜後、初めて膣に挿入するタイプの自慰用具を体験しました。
チエさんが選んだ用具は電動でピストンするタイプのディルド。
高刺激タイプのため、初心者のチエさんにはまだ早すぎたようです。



自慰用具使用時は必ず事前に説明書を熟読して操作を理解してからオナニーを始めてください。

刺激が強すぎてピストン動作を止めたいが、パニックして操作が分からずさらに強いピストンに切り替えてしまったチエさん。
この後、気を失うまで10回以上絶頂を迎え、スタッフが電源を切りました。

妊娠前後の体の変化

妊娠前



妊娠26週、チエさんのお腹が大きく膨らんでいるのが見て分かる。胎児は順調に成長中。チエさんは妊娠後、授業中、気持ち悪くなり保健室で休むこともしばしばあったが、最近は安定してきている。なお、体育の授業は全て見学となっている。

妊娠後



出産

チエさんの出産は予定日通り。
出産は体育館で行われ、性教育
委員会スタッフ、医師、教師、
同校全生徒、保護者としてチエ
さんが大家を務めるアパートの
住人男性（23）などが見守る
中、6時間で自然分娩。

出産は6台のカメラで様々な
角度から撮影。全校生徒や関係
者に教材として配布されました。






●パーソナルデータ

里中チエ (女・●2才)

本年度より●学生。体の発育状態は同年代の中で遅いほうであるが、昨今のモデル不足の中、家庭の事情から性教育モデル助成金を目当てに立候補した勤勉な生徒。

●乳頭勃起

乳房の発育は悪く、まだ膨らみ始めたばかり。●学生女子や肉付きのよい男子とあまり変わらない。しかし、乳頭は30秒ほど刺激し続けると、小さいながらも、しっかりと勃起反応を示す。




左：通常時のチエさんの乳頭
右：勃起時のチエさんの乳頭

●女性器

外見は●学生のような、綺麗なワレメの女性器。初潮は3か月前に経験済み。男性との交際・性交渉経験はなく、クスコ検査では処女膜も確認できる。発育途上ではあるが、性交・出産は可能。


















































妊娠後



妊娠26週、チエさんのお腹が大きく膨らんでいるのが見て分かる。胎児は順調に成長中。チエさんは妊娠後、授業中、気持ち悪くなり保健室で休むこともしばしばあったが、最近は安定してきている。なお、体育の授業は全て見学となっている。

妊娠前



● 妊娠前後の体の変化





